

Gyógyszer adagok

	Adag mg/kg		
Hatóanyag	tól	ig	Megjegyzés
Atropin	0.01	0.04	IV, bradycardia, újraélesztés
Dexmedetomidin	0.25 µg/kg	0.5 µg/kg	IV, nyugató
Dexmedetomidin	3 µg/kg	5 µg/kg	IM premedikáció
Acepromazin	0.01	0.05	IV, IM, nyugató
Midazolam	0.1	0.5	Görcsoldó, premedikáció súlyos betegeknek (kivéve PSS)
Metadon	0.2	0.5	IV, IM vagy SC; 4 órán át hat
Morfin	0.2	0.5	IV max adag 0,2; 4 órán át hat
Fentanil bólus	1 µg/kg	5 µg/kg	15-20 percen át ható erős fájdalomcsillapító, csak IV
Fentanil CRI	10 µg/kg	40 µg/kg	/óra, fájdalomcsillapító infúzió
Buprenorfin	10 µg/kg	20 µg/kg	6-8 órán át hat; közepesen erős fájdalomcsillapító
Butorfanol	0.1	0.4	Gyenge fájdalomcsillapító
Propofol	1	-	IV bólusok az altatás bevezetésére
Etomidát	0.2	-	IV bólusok az altatás bevezetésére
Alfaxalon	0.5	-	IV bólusok az altatás bevezetésére
Ketamin	2.5	-	IV bólusok az altatás bevezetésére
Tört adagú altatószerek a premedikációban			
Alfaxalon	0.5	2	Kiegészítő a premedikációhoz
Ketamin	1	2	Kiegészítő a premedikációhoz
Szájon át adandó nyugatók, szorongásoldók és fájdalomcsillapítók			
Gabapentin	5	50	PO; BID, TID; macskáknak 100 mg/kg is adható állatorvosi látogatás előtt 2 órával.
Trazodon	5	10	PO BID, vagy állatorvosi látogatás előtt 1 órával.
Pregabalin	Lásd a dobozon		Bonqat 50 mg/ml belsőleges oldat macskáknak. A gabapentinhez hasonló
Dexmedetomidin	Lásd a dobozon		Sileo gél. Száj nyálkahártyán át szívódik fel. Javallata: kutyák zajérzékenységének kezelésére, ill. megelőzésére (pl. villámlás, vagy tűzijáték). Szorongásoldó hatása van.
Tazipimidin	Lásd a dobozon		Tessie 0,3 mg/ml belsőleges oldat kutyáknak PO. Alfa-2 agonista. Javallata: zajok, vagy a gazda távozása kiváltotta szorongás enyhítése
Tramadol	2	10	PO; BID vagy TID; kutyában gyenge fájdalomcsillapító
Tramadol	2	4	PO; BID vagy TID; macskákban közepesen erős fájdalomcsillapító
Amantadin	3	5	PO BID. NMDA antagonist. Adalék krónikus fájdalomcsillapító protokollokhoz
Meloxicam kutyának	0.2		Egyszeri IV vagy SC inj. után 0.1 mg/kg SID PO 3-5 napig.
Meloxicam macskának	0.3		Egyszeri SC inj. adható. Folytatni nem javasolt.
Robenakoxib	2		A műtét végén egyszeri SC inj., majd kutyának és macskának is 1-2 mg/kg PO SID maximum még 2 napig.

Az adagok nem abszolút érvényűek. Változtatni a józan ész és a szakma szabályai szerint lehet.